



## ЛИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

ФАЗА	РОСТ ПОБЕГОВ	ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ	НАЧАЛО КЛУБНЕВАНИЯ	КЛУБНЕВАНИЕ
ЦЕЛЬ	ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 40-45 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 60-70 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ
УСИЛЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗВИТИЯ	<b>Текамин Макс</b> 1 л/га/обр. (1 обр.)			
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА ТОВАРНЫХ КЛУБНЕЙ		<b>Текамин Макс</b> 1-2 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Текамин Макс</b> 1-2 л/га/обр. (1 обр.)	
ПРОФИЛАКТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ		<b>Текнокель Амино Мик</b> 1,5-2 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Текнокель Амино Мик</b> 1,5-2 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Текнокель Амино Мик</b> 1,5-2 л/га/обр. (1 обр.)
СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ КОРИЧНЕВЫХ ПЯТЕН			<b>Текнокель Амино Са-В</b> 2-3 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Текнокель Амино Са-В</b> 2-3 л/га/обр. (1 обр.)
ДЕФИЦИТ Mg			<b>Текнокель Амино Mg</b> 2 л/га/обр. (1 обр.)	
ПРОБУДИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЯ	<b>Текнофит РК</b> ФОСФАТ КАЛИЯ 2-3 л/га/обр. (несколько обработок в зависимости от распространения болезней)			

## ФЕРТИГАЦИЯ

ФАЗА	ПОСАДКА	РОСТ ПОБЕГОВ	ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ	НАЧАЛО КЛУБНЕВАНИЯ	КЛУБНЕВАНИЕ
ЦЕЛЬ		ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 40-45 ДНЕЙ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	ЧЕРЕЗ 60-70 ДНЕЙ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ
УЛУЧШЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ	<b>Текамин Раис</b> Погружением клубней или опрыскиванием раствор 10 мл/л				
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА КЛУБНЕЙ		<b>Агрифул</b> 5 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Агрифул</b> 5 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Агрифул</b> 5 л/га/обр. (1 обр.)	<b>Агрифул</b> 5 л/га/обр. (1 обр.)

Многочисленные обработки в низкой дозе дают лучший эффект, чем редкие обработки с применением высоких доз.

При применении препаратов на одной и той же фенологической стадии, их дозы должны быть снижены.

Рекомендуем предварительно проконсультироваться у официального дистрибьютора, чтобы подобрать наилучшую программу подкормок.

Обр. = Обработка